

# Centril

## Comprimidos 50 mg

Uso Veterinário

Dose única para cães e gatos

### Fórmula:

**Cada comprimido de 120 mg contém:**

Enrofloxacino (base) ..... 50 mg

Excipiente q.s.p. .... 120 mg

### Indicações:

Centril Comprimidos 50 mg é indicado para cães e gatos, nas infecções causadas por bactérias, tanto nas Gram-positivas como nas Gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis ao princípio ativo, tais como:

- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas spp.* e *Mycoplasma spp.*;
- Piodermites causadas por *Staphylococcus intermedius*, *S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus mirabilis*;
- Infecções genitourinárias causadas por *E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Enterobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Mycoplasma spp.* e *Klebsiella spp.*;
- Diarréias causadas por *E. coli*, *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.*;
- Otitis causadas por *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e *Proteus spp.*;
- Também atua como preventivo nas infecções causadas por lesões acidentais e no pós-cirúrgico.

### Posologia e modo de usar:

Centril Comprimidos 50 mg deve ser administrado por via oral, para cães e gatos, puro ou misturado à ração, nas seguintes doses: 5 mg de Enrofloxacino por kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso, a cada 24 horas, durante 5 dias. Continuar o tratamento por um período nunca inferior a 48 horas, após o desaparecimento dos sintomas.

### Contraindicações:

O produto é contraindicado em caso de animais hipersensíveis aos componentes da fórmula. A droga deverá ser utilizada com reserva em cães durante a fase de crescimento rápido: raças pequenas e médias, entre 2 e 8 meses de idade e raças grandes até os 18 meses. Isso porque, embora esporadicamente, poderá causar prejuízo à formação das articulações.

Para gatos o Enrofloxacino somente deve ser aplicado após o animal atingir 2 meses de idade. Não utilizar em animais prenhes e ainda, com insuficiência renal.

### Precauções:

Produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

- Conservar em local seco e fresco (até 25°C), ao abrigo da luz solar direta.

- Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

### Interações medicamentosas:

Não associar o produto com tetraciclina, macrolídeos, teofilina, sulfas + trimetoprim e rifampina em virtude das propriedades antagônicas destas drogas. Não administrar este produto em conjunto com soluções contendo alumínio, cobre, ferro, zinco, magnésio e cálcio sob risco de reduzir a absorção de enrofloxacino.

**Apresentação:** Cartucho contendo blister com 10 comprimidos e display contendo 10 blisters com 10 comprimidos cada.

### Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça CRF - SP 53482

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.697 em 04/09/03

### Fabricante:

Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
Rua João Augusto Cirelli nº 640  
Distrito Industrial - Descalvado - SP  
CNPJ: 50.472.547/0001-68

### Proprietário:



**centagro**

Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.  
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP  
CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300  
www.centagro.com.br  
CNPJ: 23.793.946/0001-58  
Indústria Brasileira 

 **S.A.C.**  
08009410060

